


Struttura tettonica “a blocchi”




Legenda: 1- Horst ; 2-aree emerse dall'Eocene sup. ; 3-Graben ; 4-Blocchi intermedi ; 5-Faglie

Tale struttura generale riflette la varietà dei paesaggi carsici, che possiamo classificare in 4 tipi:


- I rilievi calcarei occidentali (S.ra de Los Organos e del Rosario)
- Il carso di montagna del centro (Escambray)
- Le pianure carsiche (Habana e Matanzas)
- La piattaforma carbonatica sommersa.

Regionalizzazione delle manifestazioni carsiche




La *Cordillera de Guaniguanico* si divide in due settori:
a ovest, la Sierra de los Organos
con carsismo a torri e a coni;
a est, la Sierra del Rosario (carso tabulare, a coni nella zona nord).
Sono presenti “polje” sia *interni* che *marginali*.

Distribuzione delle unità strutturali nella cordillera di Guaniguanico



Puntinato fitto: unità “Viñales” ; tratto orizz.: unità “Infierno”


Cordillera de Guaniguanico: distribución de los litotipos carbonáticos (1) y terrígenos (2)





Sezioni geologiche di alcuni *mogotes*

Sono interessati tutti
dall'accavallamento di diverse unità
tettoniche anche con litologia differente


Sierra Quemado



Vinales



Una superficie di sovrascorrimento è visibile nella Sierra Quemado:
l'unità di Viñales (V) sull'unità dell'Infierno (I)



L'area montuosa centrale della provincia di Pinar del Rio costituisce una importante area protetta.

Istituita nel 1985, su un'area di circa 250 kmq, una "riserva della biosfera" (Sierra del Rosario) protegge la ricchissima biodiversità degli ecosistemi di foreste sempreverdi e semidecidue rappresentativi degli ambienti naturali incontaminati dell'isola.

La temperatura media è di 24°, la piovosità annua 1600-2000 mm

